

C. RECHERCHER UNE INFECTION BACTERIENNE POSSIBLE

DEMANDER :	OBSERVER, ECOUTER, PALPER :
<ul style="list-style-type: none"> Le nourrisson a-t-il eu des convulsions? 	<ul style="list-style-type: none"> Compter les mouvements respiratoires pendant une minute Recommencer si le nombre est élevé. Rechercher un tirage sous costal grave. Rechercher un battement des ailes du nez. Écouter un geignement expiratoire. Regarder et palper une fontanelle bombée. Regarder si du pus s'écoule des oreilles. Regarder l'ombilic. Est-il rouge ou suintant de pus? La rougeur s'étend-elle à la peau? Prendre la température* (ou toucher le nourrisson : A-t-il de la fièvre ou est-il hypothermique)? Rechercher des pustules cutanées. Sont-elles nombreuses? Regarder si le nourrisson est léthargique ou inconscient (incapable de se nourrir). Regarder les mouvements spontanés du nourrisson. Bouge-t-il moins que la normale? Rechercher la couleur jaune des téguments, des paumes et des plantes des pieds chez le nouveau-né âgé de 0 à 7 jours
	<p>NB :</p> <p>* Chez le nouveau-né 0 – 7 jours :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyperthermie si température supérieure ou égale à 37.5° Hypothermie si température inférieure à 35.5°

LE NOURRISSON DOIT ETRE CALME

Classer tous les nourrissons

* Si le transfert n'est pas possible, voir *Prise en charge de l'enfant.*
Annexe : Lorsque le transfert n'est pas possible

<i>Rechercher</i> Les SIGNES	CLASSER <small>(Les traitements urgents pré-évacuation sont en caractères gras)</small>	IDENTIFIER LE TRAITEMENT
<ul style="list-style-type: none"> Convulsions ou Respiration rapide (60 mouvements respiratoires par minute ou plus) ou Tirage sous-costal grave ou Battement des ailes du nez ou Bombement de la fontanelle ou Écoulement de pus de l'oreille ou Rougeur ombilicale gagnant la peau ou Fièvre (38°C ou plus, ou corps chaud au toucher) ou hypothermie ou Pustules cutanées nombreuses ou Léthargique ou inconscient, incapable de se nourrir. Geignement expiratoire Mouvements spontanés du nourrisson rares ou absents 	POSSIBILITE D'INFECTION BACTERIENNE GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Donner la première dose d'antibiotique en intramusculaire. ➤ Traiter pour éviter l'hypoglycémie ➤ Expliquer à la mère comment veiller à ce que le nourrisson n'ait pas froid en cours de route. ➤ Transférer d'URGENCE le nourrisson.
<ul style="list-style-type: none"> Ombilic rouge ou suintant de pus ou Pustules cutanées. 	INFECTION BACTERIENNE LOCALE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Donner un antibiotique approprié par voie orale. ➤ Apprendre à la mère à traiter les infections locales à domicile ➤ Expliquer à la mère comment soigner le nourrisson à domicile. ➤ Revoir après 2 jours
<ul style="list-style-type: none"> Pas de signes d'infection bactérienne grave ou locale 	PAS D'INFECTION BACTERIENNE GRAVE, NI LOCALE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Expliquer à la mère comment prendre soin du nourrisson à domicile ➤ Expliquer quand revenir immédiatement